Fiche de Préconisations ECBU

EN SAVOIR + www.biomed21.fr

Le recueil peut être effectué à n'importe quel moment de la journée, avec au mieux, un intervalle de 4 heures entre la miction précédente et la miction du recueil sauf urgence / rétention vésicale difficile.

1. Identifier le flacon et indiquer la date et l'heure de recueil du prélèvement sur le flacon.
2. Réaliser le recueil d'urine :

Se laver soigneusement les mains avec du savon puis effectuer une toilette intime à l'aide de la lingette désinfectante fournie.

Dévisser le couvercle et le poser sur une surface plane.

ne pas toucher l'intérieur du pot, ni la canule intégrée



Commencer à uriner dans les toilettes (1er jet) puis dans le flacon.

Bien revisser le bouchon

Attention : Pour la recherche de Mycoplasmes, Chlamydiae, Gonocoque ou en cas de suspiçion de prostatite, il est nécessaire de recueillir le 1er jet d'urine de préférence sur les premières urines du matin ou au moins 2h après la dernière miction.

3. Conservation : Apporter les urines dans les 2h sinon conserver le flacon au réfrigérateur 12 h maximum.
4. Afin d'optimiser la prise en charge de votre dossier, *renseigner* impérativement les informations au verso

Nom de naissance* : ..... Prénom* : .....

Nom usuel* :.....Date de naissance* : .....

Adresse* : ..... Tél* : .....

Date du recueil : ....Heure du recueil : ....

Mode de recueil : ☐ Miction ☐ Sondage ☐ Sonde à demeure ☐ Urinocol

Température de conservation : ☐ Température ambiante ☐ Réfrigérateur

Renseignements cliniques (cocher les cases correspondantes)

☐ Brulures en urinant

☐ Envie fréquente d'uriner

☐ Fièvre

☐ Douleurs abdominales

☐ Absence de symptômes

☐ Traitement antibiotique en cours : lequel ?.....

☐ Traitement antibiotique arrêté depuis.....

☐ Grossesse

☐ Opération prévue

☐ Règles en cours

☐ Suspicion de prostatite

☐ Avant consultation urologique

☐ Avant instillation

*Informations obligatoires