

RECUEIL D'UNE EXPECTORATION

Le prélèvement doit être effectué de préférence le matin à jeun, avant toute prise d'antibiotiques ou au moins 48h après la fin du traitement, sauf en cas de signes cliniques aigus, ou sur prescription médicale.

Instructions pour le recueil :

- Commencer par se rincer la bouche.
- Ouvrir le flacon sans toucher l'intérieur
- Après un effort de toux prolongé, recueillir le crachat SANS SALIVE dans le flacon fourni. (Tout prélèvement salivaire doit être rejeté).
- En cas de difficulté à expectorer, faire appel à un kinésithérapeute.
- Refermer hermétiquement le flacon.
- Identifier le flacon en notant votre nom de naissance*, nom usuel*, prénom* et date de naissance* sur l'étiquette.

<u>Transport</u>: Apporter le flacon au laboratoire <u>dans l'heure qui suit</u> le prélèvement. Ne pas placer le flacon au réfrigérateur.

Merci de renseigner les informations cliniques >	Pathologie connue (BPCO, mucoviscidose, autre):
et de joindre l'ordonnance et ce document avec votre prélèvement	Signes cliniques (toux, fièvre):

(*) Informations obligatoires



www.biomed21.fr

BIO MED²

RECUEIL D'UNE EXPECTORATION

Le prélèvement doit être effectué de préférence le matin à jeun, avant toute prise d'antibiotiques ou au moins 48h après la fin du traitement, sauf en cas de signes cliniques aigus, ou sur prescription médicale.

Instructions pour le recueil :

- Commencer par se rincer la bouche.
- Ouvrir le flacon sans toucher l'intérieur
- Après un effort de toux prolongé, recueillir le crachat SANS SALIVE dans le flacon fourni. (Tout prélèvement salivaire doit être rejeté).
- En cas de difficulté à expectorer, faire appel à un kinésithérapeute.
- Refermer hermétiquement le flacon.
- Identifier le flacon en notant votre nom de naissance*, nom usuel*, prénom* et date de naissance* sur l'étiquette.

<u>Transport</u>: Apporter le flacon au laboratoire <u>dans l'heure qui suit</u> le prélèvement. **Ne pas placer le flacon au réfrigérateur**.

Merci de renseigner les informations cliniques >	Pathologie connue (BPCO, mucoviscidose, autre):
et de joindre l'ordonnance et ce document avec votre prélèvement	Signes cliniques (toux, fièvre):

(*) Informations obligatoires



www.biomed21.fr

MU-ACCU-ENR-007-06 Page 1/1 MU-ACCU-ENR-007-06 Page 1/1