Fiche de préconisations ECBU avec tube percuteur

Le recueil peut être effectué à n'importe quel moment de la journée, avec au mieux, un intervalle de 3 heures entre la miction précédente et la miction du recueil.

1. Identifier le flacon et le tube, indiquer la date et l'heure de recueil du prélèvement sur le flacon.

2. Réaliser le recueil d'urine

Se laver soigneusement les mains avec du savon puis effectuer une toilette intime à l'aide de la lingette désinfectante fournie.

Dévisser le couvercle et le poser sur une surface plane.

ne pas toucher l'intérieur du pot, ni la canule intégrée



Commencer à uriner dans les toilettes (1er jet) puis dans le flacon.

Bien revisser le bouchon.

Soulever l'étiquette située sur le dessus du couvercle. Ne jamais toucher l'aiguille caoutchoutée à l'intérieur de l'orifice.

Sans retirer le bouchon, placer le tube dans l'orifice jusqu'à perforation du bouchon du tube : l'urine est aspirée.



Maintenir le tube jusqu'au remplissage complet (trait sur l'étiquette) puis le retirer, homogénéiser par 8 à 10 retournements

Conserver le tube à température ambiante 24h maximum. Conserver le flacon à température ambiante 2h max. et au-delà au réfrigérateur 12h maximum.

Attention : Pour la recherche de Mycoplasmes, Chlamydiae ou en cas de suspicion de prostatite, il est nécessaire de recueillir le 1er jet d'urine

3. Afin d'optimiser la prise en charge de votre dossier, *renseigner* impérativement les informations ci-dessous

Nom : ..... Prénom : .....

Nom de naissance :..... Date de naissance : .....

Adresse : ..... Tél : .....

Date du recueil : ..... Heure du recueil : .....

Mode de recueil : ☐ Miction ☐ Sondage ☐ Sonde à demeure ☐ Urinocol

Température de conservation : ☐ Température ambiante ☐ Réfrigérateur

<u>Renseignements cliniques</u> (cocher les cases correspondantes)

☐ Brulures en urinant
☐ Envie fréquente d'uriner
☐ Fièvre
☐ Douleurs abdominales
☐ Absence de symptômes
☐ Traitement antibiotique en cours : lequel ?.....
☐ Traitement antibiotique arrêté depuis.....

☐ Grossesse
☐ Opération prévue
☐ Règles en cours
☐ Suspicion de prostatite
☐ Avant consultation urologique
☐ Avant instillation